

BOESSNECK, JOACHIM & ANGELA VON DEN DRIESCH: Die jungpleis-
tozänen Tierknochenfunde aus der Brillenhöhle (mit Beiträ-
gen von Johannes Lepiksaar und Gerhard Storch), = Das
Paläolithikum der Brillenhöhle bei Blaubeuren (Schwäbische
Alb) II, hrsg. von GUSTAV RIEK. Verlag Müller und Gräff,
Kommissionsverlag Stuttgart 1973. ISBN 3 875 320565; 131
pag., 17 platen, in linnen geb. Prijs: DM. 34,--.

In de jaren 1955 tot 1963 hebben er systematische opgravingen
plaatsgevonden in de Brillenhöhle. Het profiel van de opgra-
ving laat XIX afzettingen zien, waarvan de lagen I tem. III
afgezet zijn na het ijstijdvak. De overige lagen leverden
een grote hoeveelheid beenderen op, die in de lagen IV tem.
VII het rijkst vertegenwoordigd waren (in totaal 6476 been-
deren van zoogdieren, vogels en amphiënen).

Van de zoogdieren worden achtereenvolgens behandeld:

Hazen, Lepus timidus en Ochotona pusilla; wolf, Canis lupus;
vossen, Vulpes vulpes en Alopex lagopus; beren, Ursus spelaeus
en Ursus arctos; hermelijn en wezel, Mustela erminea en Mus-
tela vulgaris (c.g. nivalis); bunzing, Putorius putorius;
grottenhyaena, Crocuta spelaea; grottenleeuw, Panthera spe-
laea; lynx, Lynx lynx; mammoet, Mammuthus primigenius; wild
paard, Equus cf. caballus; edelhert, Cervus elaphus; rendier,
Rangifer tarandus; steppewisent of oeros, Bison priscus of
Bos primigenius; wild schaap en gedomesticeerd schaap, Ovis
cf. ammon en Ovis aries; steenbok, Capra ibex; gems, Rupica-
pra rupicapra; saiga- antilooop, Saiga tatarica.

Er worden maar liefst 43 vogelsoorten en 2 soorten amphiënen
behandeld. Van de kleine zoogdieren (insectivora, chiroptera
en rodentia) worden 23 soorten besproken. Een uitvoerige li-
teratuurlijst ontbreekt niet, en op 17 platen worden veel
stukken duidelijk afgebeeld.

Dick Mol